


# Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
RHÔNE-ALPES



## Arboriculture

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

Abonnement annuel : 160 Frs - Régisseur Recettes DRAF Rhône-Alpes

Bulletin n° 4 - 28 Février 1990

**Psylle du poirier** : n'employez pas les colorants nitrés au-delà du stade C  
**Oïdium du pommier** : protection dès le stade B sur les variétés sensibles  
**Cloque du pêcher** : maintenez la protection  
**Puceron vert du pêcher** : pas de traitement systématique  
**Moniliose du pêcher et de l'abricotier** : intervenez cette semaine

### PSYLLE DU POIRIER

Le maximum des pontes est atteint.

L'intervention aux colorants nitrés est à réaliser au plus tard cette semaine.

En raison des risques de phytotoxicité, évitez d'appliquer les colorants nitrés au-delà du stade C.

### OIDIUM DU POMMIER

Dans les parcelles où cette maladie cause des dommages, intervenez dès le stade B, de façon à limiter la production de conidies des pousses oïdiées primaires.

*Produits utilisables :*

NIMROD - AFUGAN CE - BAYLETON 5.

### CLOQUE DU PECHER

Les pêchers sont actuellement très sensibles, de plus les conditions climatiques du moment sont très favorables aux contaminations. Aussi, nous vous conseillons de renouveler votre application cette semaine.

### PUCERON VERT DU PECHER



D

On voit la corolle.

Une intervention se justifie si plus de 7 % des rameaux sont occupés par un ou plusieurs pucerons.

Dans le sud de la région (sud Drôme, Bas Vivarais, Vallée de l'Heyrieux) où la floraison a débuté, un traitement sera effectué à la chute des pétales.

Pour les secteurs situés au nord de Valence, évitez d'intervenir sur les variétés qui commencent à fleurir.

Dans les vergers plurivariétaux, où la phénologie est étalée (stade D à F), choisissez de préférence un insecticide qui est autorisé pendant la floraison.

*Produits utilisables :*

FASTAC	0,03 l de spécialité commerciale/hl
DECIS	0,05 l de spécialité commerciale/hl
SUMI ALPHA	0,04 l de spécialité commerciale/hl
KLARTAN	0,02 l de spécialité commerciale/hl - emploi autorisé pendant la floraison
TECHN'UFAN	0,17 l de spécialité commerciale/hl - emploi autorisé pendant la floraison
PIRIMOR G	0,075 kg de spécialité commerciale/hl - emploi autorisé pendant la floraison
cyperméthrine	0,005 kg de ma/hl Nombreuses spécialités

P669

## MONILIOSE DU PECHER

La protection de la floraison nécessite deux traitements :

- le premier au stade D-E ;
- le second au stade G (chute des pétales).

Pour le choix des produits, reportez-vous au paragraphe suivant : Moniliose de l'Abricotier.

## MONILIOSE DE L'ABRICOTIER

Les variétés à floraison précoce (Beliana - Priana...) sont en pleine fleur.



D  
On voit la corolle.



E  
On voit les étamines.

Pour la variété Bergeron le stade D est atteint dans la région de Valence - Tain - Larnage - Châteaubourg - Colombier le Jeune.

Dans les plantations de Bergeron situées dans le Rhône et dans la Loire, le stade "bouton blanc" sera atteint vers le 5 Mars.

Effectuez une première application au stade D-E ;

Un deuxième traitement sera effectué au début de la chute des pétales. Eventuellement, envisagez une intervention durant la floraison en cas de pluies abondantes.

### Produits utilisables :

#### \* Groupe des benzimidazoles :

BENLATE	0,060 kg de spécialité commerciale/hl
carbendazime	30 g de ma/hl - Nombreuses spécialités

#### \* Autres fongicides :

BAYCOR 300 EC	0,1 l de spécialité commerciale/hl - Ne pas utiliser sur pêcher
BAYTAN 5 liquide	0,2 l de spécialité commerciale/hl - Ne pas utiliser sur pêcher
DORADO	0,025 l de spécialité commerciale/hl
KIDAN	0,3 l de spécialité commerciale/hl
ROVRAL	0,150 kg de spécialité commerciale/hl
RONILAN	0,100 kg de spécialité commerciale/hl
SUMISCLEX	0,150 kg de spécialité commerciale/hl
SYSTHANE 12 E	0,06 l de spécialité commerciale/hl

## TEIGNE DES FLEURS DE CERISIER

La plupart des variétés ont atteint le stade B (gonflement des bourgeons à fleur).

Dans les vergers où ce parasite provoque des dégâts, appliquez dès à présent un oléoparathion à la dose de 45 g de ma/hl.

## CORYNEUM - BACTERIOSE - MONILIOSE DU CERISIER

Effectuez dès cette semaine un traitement cuprique à la dose de 250 g de cuivre métal/hl.

Il est important d'apporter un volume suffisant de bouillie (1 000 l à 1 200 l selon la forme des arbres) afin de bien mouiller l'ensemble des arbres.